

### Médicaments

Au Québec, l'usage des médicaments destinés aux animaux en élevage est régi par des lois et règlements sur les médicaments vétérinaires. Ces médicaments doivent être prescrits par un vétérinaire qui en expliquera le bon usage, notamment en précisant les périodes d'attente à respecter avant l'abattage de la volaille de chair ou la consommation des œufs.

### 5.2 Maladies courantes dans les élevages de volailles

Les tableaux suivants présentent divers signes cliniques observés dans les élevages et les maladies qui y correspondent. Il est important de ne pas poser de diagnostic par soi-même et de consulter un vétérinaire.

#### Problèmes respiratoires

Signes cliniques	Maladie	Cause	Espèces touchées	Remarque
Enflure sous les yeux (sinusite), respiration rauque et ardue, écoulement nasal ou oculaire.	Sinusite infectieuse	Mycoplasme: <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Dinde, poulet, faisan, canard, paon	Cette maladie a été éradiquée dans les élevages commerciaux, mais demeure présente chez la volaille de basse-cour. Les oiseaux sont souvent contaminés par les parents, et les signes vont apparaître en situation de stress (p. ex. : variation de température). Le sujet peut être traité par antibiotique, mais il demeure porteur et peut transmettre la maladie.
Difficultés respiratoires, respiration rauque et ardue, crachats teintés de sang, respiration avec cou allongé. Plusieurs décès en quelques jours.	Laryngo-trachéite infectieuse	Virus: <i>Iltovirus</i> (famille des <i>Herpesviridae</i> )	Poulet, paon, faisan	Les oiseaux infectés sont porteurs à vie et transmettront la maladie. Aucun traitement disponible mais le virus propagé dans la litière peut être éliminé en le chauffant durant 4 jours à 38 °C. Un vaccin existe.
Difficultés respiratoires chez des jeunes oiseaux, respiration rauque et ardue, cou allongé.	Aspergillose	Fongus: <i>Aspergillus fumigatus</i>	Jeune (de 0 à 2 semaines d'âge) poussin, dindonneau, faisan	Il n'y a pas de traitement. Changer la paille et la litière. Éviter la litière humide.
Respiration laborieuse avec bec ouvert, coloration foncée (cyanose), perte de poids chronique, distension de l'abdomen.	Ascite	Défaillance cardiaque liée à une croissance rapide	Poulet de chair	Ralentir la croissance en procurant au moins 8 heures d'obscurité par jour ou en retirant la moulée la nuit. Il n'existe pas de médicament.